

RESUMEN

Autor [Morales Mejía, C.J.](#)
Autor [Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima \(Peru\).](#)
corporativo [Facultad de Zootecnia. Dpto. Académico de Producción](#)
[Animal](#)
Título Comparación de parámetros de incubación de huevos fértiles
procedentes de Perú y Brasil
Impreso Lima : UNALM, 2014

Copias

Ubicación	Código	Estado
Sala Tesis	L01. M828 - T	USO EN SALA
Descripción	58 p. : 26 cuadros, 6 gráficos, 23 ref. Incluye CD ROM	
Tesis	Trabajo Monográfico (Ing Zootecnista)	
Bibliografía	Facultad : Zootecnia	
Sumario	Sumario (Es)	
Materia	PARAMETROS DE INCUBACION NATALIDAD HUEVOS FERTILIDAD INCUBACION DE HUEVOS ECLOSANIBILIDAD DEL HUEVO CARACTERISTICAS DEL HUEVO EVALUACION BRASIL PERU HUEVOS FERTILES INCUBABILIDAD	
Nº estándar	PE2015000429 B / M EUV L01	

El objetivo del trabajo monográfico fue comparar los parámetros de incubación (fertilidad, incubabilidad y natalidad) de los huevos fértiles procedentes de Brasil y Perú. Basándose en una recopilación y comparación de datos; parámetros de incubación; entre el huevo fértil de procedencia de Brasil y Perú. Estos resultados nos van a servir para tomar decisiones, sobre si es viable o no el importar el huevo fértil de Brasil. Es muy importante conservar el potencial de incubabilidad de los huevos recién producidos; pueden suceder muchas cosas a un huevo entre el tiempo en que es puesto y el momento en que entra a la incubadora, como resultado de un mal manejo puede perderse gran parte de la cualidad heredada del huevo. A pesar que los huevos fértiles importados de Brasil, sufren un estrés por el transporte desde la granja (Brasil) hasta la Planta de Incubación (Perú), los resultados obtenidos son favorables en cuanto a los parámetros de incubación como porcentaje de fertilidad, porcentaje de nacimiento y porcentaje de incubabilidad. El huevo fértil procedente

de Perú, tiene mejores parámetros en cuanto a incubabilidad y natalidad. Las condiciones ambientales y de manejo del huevo, desde que es puesto hasta que llegue a ser incubado, juegan un rol importante en los parámetros de incubabilidad y nacimiento. Si se rompe la cadena de frío, que debe tener el huevo durante todo el traslado hacia la planta, se va a tener una pérdida de Incubabilidad.