

RESUMEN

Autor Román Montalbán, U.D.
 Autor corporativo Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Peru). Escuela de Posgrado, Maestría en Suelos
 Título Productos dispersantes de la salinidad del suelo y su efecto en el crecimiento de maíz (*Zea mays L.*) en invernadero
 Impreso Lima : UNALM, 2017

Copias	Ubicación	Código	Estado
Sala Tesis		<u>P35. R6 - T</u>	USO EN SALA
	Descripción	96 p. : 23 fig., 15 tablas, 49 ref. Incluye CD ROM	
	Tesis	Tesis (Mag Sc)	
	Bibliografía	Posgrado : Suelos	
	Sumario	Sumarios (En, Es)	
	Materia	<u>ZEA MAYS</u> <u>ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PLANTA</u> <u>DISPERSANTES</u> <u>SUELO SALINO</u> <u>RESPUESTA DE LA PLANTA</u> <u>CONTENIDO DE MATERIA SECA</u> <u>CONCENTRACION</u> <u>SALINIDAD</u> <u>INVERNADEROS</u> <u>EVALUACION</u> <u>PERU</u> <u>PRODUCTOS DISPERSANTES</u>	
	Nº	PE2017000459 B /	
	estándar	M EUV P35	

La salinidad del suelo reduce la fertilidad del suelo y afecta en forma negativa a la gran mayoría de los cultivos de importancia económica. En el mercado de los agroquímicos, se ofrecen diversos productos como dispersantes de sales, los que teóricamente pueden ayudar en gran medida a mejorar las propiedades de un suelo salino. Los objetivos fueron: evaluar el efecto de los productos dispersantes de sales en el crecimiento y la producción de materia seca en el maíz (*Zea mayz L.*); y determinar el efecto de los dispersantes en la concentración de los elementos que determinan la salinidad. Con la finalidad de observar el efecto de

diferentes productos dispersantes, se planteó el presente trabajo experimental, el cual se instaló en el invernadero de fertilidad de suelos “Sven Villagarcía” de la Universidad Agraria La Molina, con suelo proveniente del distrito de Catacaos, provincia de Piura. En el trabajo se establecieron tres variables; lavado del suelo (S1= suelo sin lavar y S2= suelo lavado); efecto del dispersante (F1=Dispersal, F2=Saltrad y F3=Gypcal); y las dosis (D1=Dosis 1, D2=Dosis 2 y D3=Dosis 3). Se realizaron 3 mediciones de altura de planta, a los 25,40 y 90 días de acuerdo a su estado fenológico. Al finalizar el experimento se evaluó la materia seca de follaje y de raíz, y posteriormente se hizo el análisis de salinidad del suelo. Se empleó el diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial $2 \times 3 \times 3 + 1$ testigo, considerándose en total 19 tratamientos cada uno con 4 repeticiones. Los resultados obtenidos para altura de planta que presentaron respuestas significativas fueron las interacciones S1F2 (39.66 cm), S2F1 (50.72 cm), S2D2 (41.67 cm), S2D3 (47.87 cm), F1D3 (48.21 cm) Y F2D2 (47.87 cm); para materia seca de follaje las interacciones que presentaron respuestas significativas fueron S2F1D1 (18.24 g/maceta) y S2F1D3 (18.64 g/maceta); y finalmente, para materia seca de raíz se encontraron respuestas significativas para las interacciones S2F1D2 (3.44 g/maceta) y S2F2D3 (3.78 g/maceta). En el análisis de salinidad del suelo no se encontraron diferencias significativas.

Abstract

Soil salinity reduces soil fertility and negatively affects the vast majority of crops of economic importance. In the agrochemicals market, various products are offered as salt remover, which theoretically can greatly help to improve the properties of a saline soil. The objectives were: to evaluate the effect of salt dispersants on growth and dry matter production in corn (*Zea mayz L.*); and determine the effect of the dispersants on the concentration of the elements that determine salinity. With the purpose of observing the effect of different dispersant products, the present experimental work was proposed, which was installed in the soil fertility greenhouse "Sven Villagarcía" of La Molina Agrarian University, with soil from the district of Catacaos, in the province of Piura. In the work three variables were established; washing of the soil (S1 = soil not washed and S2 = soil washed); effect of the dispersant (F1 = Dispersal, F2 = Saltrad and F3 = Gypcal); and doses (D1 = Dose 1, D2 = Dose 2 and D3 = Dose 3). Three measurements of plant height were made at 25, 40 and 90 days according to their phenological status. At the end of the experiment the dry matter of foliage and roots were evaluated, subsequently the soil salinity analysis was performed. The experimental design of randomized complete blocks with factorial arrangement $2 \times 3 \times 3 + 1$ control was

used, considering in total 19 treatments each with 4 replicates. The results obtained for plant height that presented significant responses were S1F2 (39.66 cm), S2F1 (50.72 cm), S2D2 (41.67 cm), S2D3 (47.87 cm), F1D3 (48.21 cm) and F2D2 (47.87 cm); for dry matter of foliage the interactions that presented significant answers were S2F1D1 (18.24 g / pot) and S2F1D3 (18.64 g / pot); and finally, for root dry matter were found significant responses for the interactions S2F1D2 (3.44 g / pot) and S2F2D3 (3.78 g / pot). No significant differences were found in soil salinity analysis.